

## **CARACTERIZAÇÃO DE LESÕES BUCAIS E FATORES CONTRIBUINTE PARA A SUA MANIFESTAÇÃO EM USUÁRIOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS**

João Rubens Teixeira de Castro Silva<sup>1</sup>; José Carlos Barbosa Andrade Júnior<sup>2</sup>; Ana Conceição de Oliveira Cravo Teixeira<sup>3</sup>; Kaliane Rocha Soledade<sup>4</sup>; Larissa Rolim Borges Paluch<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Mestrando em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (FAMAM), rubenscastro@live.com; <sup>2</sup>Mestrando em Biotecnologia (FAMAM), junior.andrade.11@hotmail.com; <sup>3</sup>Mestra em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (FAMAM), FAMAM, aninhacravo@yahoo.com.br; <sup>4</sup>Doutora em Processos Interativos dos Órgãos e Sistemas (UFBA), FAMAM, krsoledade@gmail.com; <sup>5</sup>Doutora em Ciências Biológicas (UFPR), FAMAM, larissapaluch@gmail.com.

A prótese dentária removível representa uma alternativa imprescindível para muitas pessoas que perderam diversas unidades dentárias. Esses dispositivos promovem o restabelecimento dos componentes estéticos, fonéticos e funcionais, como também diminuem a possibilidade de problemas osteoarticulares na articulação temporomandibular. Entretanto, se não planejadas e confeccionadas adequadamente podem acarretar severos problemas à saúde bucal do usuário, como a manifestação de lesões em virtude da sua adaptação deficiente e/ou higienização inadequada. Este estudo teve como objetivo identificar as principais lesões bucais, bem como os fatores que contribuem para o seu surgimento em usuários de uma Unidade Básica de Saúde em um município do Recôncavo da Bahia. Trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa. Foi realizado o preenchimento de um formulário semiestruturado e exames clínicos bucais como instrumento de coleta. O estudo contemplou os preceitos éticos determinados para a realização de pesquisas com seres humanos e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FAMAM, com o parecer número 3.050.538. Participaram 66 voluntários usuários de próteses removíveis. Foi realizada análise estatística de regressão logística binomial das variáveis frente à presença lesões bucais no software SPSS versão 22.0. A maior parte dos pacientes avaliados apresentou um (53,10%) ou mais de um tipo de lesão (22,70%). Desses, as principais lesões identificadas foram: estomatite protética (52,31%), úlcera traumática (20,00%), hiperplasia fibrosa inflamatória (18,46%) e queilite angular (9,23%). Os possíveis fatores influentes identificados para o desenvolvimento das lesões não apresentaram relação estatisticamente significativa, entretanto corroboraram com a literatura, sendo observadas: higienização insatisfatória (57,6%) e adaptação deficiente (50,0%) da prótese removível utilizada no momento da coleta. Desta forma, torna-se necessária a realização de mais pesquisas abrangendo uma população maior, a fim de determinar estatisticamente quais fatores influenciam ou não no desenvolvimento de cada lesão identificada neste estudo. Como também, verifica-se a importância da elaboração de ações preventivas e educativas, assim como intervenções clínicas, visando melhorias à saúde bucal e qualidade de vida da população.

**Palavras-chave:** Patologia Bucal. Reabilitação. Odontologia Comunitária.