

CONHECIMENTO DE PAIS DE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE PERDA PRECOCE DOS PRIMEIROS MOLARES INFERIORES PERMANENTES

Michelli Lemos dos Santos^{*}

Ellen dos Santos Silva^{*}

Eliomar Almeida Santos^{*}

Renata Oliveira Neri^{**}

Maria do Carmo Vasquez Fernandes BastosNagahama^{***}

A erupção do primeiro molar permanente caracteriza o início da dentição mista. Isso não sucedem dentes decíduos, erupcionando de uma única vez na arcada, faz com que muitos dos responsáveis passem despercebidos que é um dente permanente, negligenciando os cuidados necessários. Devido à sua complexidade anatômica, apresentando cicatrículas e fissuras, esses dentes se tornam mais suscetíveis a cárie dentária e necessitam de maiores cuidados. Eles são responsáveis pela função mastigatória, estabilidade da forma do arco dentário e posicionamento dos dentes. Sua perda precoce pode levar a extrusão dos dentes antagonistas, rotação dos segundos molares, alteração da função mastigatória e etc. O objetivo geral desse estudo foi avaliar o conhecimento de pais de escolares do Ensino Fundamental I de escola da rede pública e privada, do município de Cruz das Almas- BA, em relação a perda precoce dos primeiros molares inferiores permanentes. E os objetivos específicos foram caracterizar o perfil socioeconômico dos pais; verificar, junto aos pais, aspectos relacionados à saúde bucal de seus filhos; e também avaliar às condições clínicas dos primeiros molares permanentes inferiores de crianças. Trata-se de um estudo transversal, descritivo de abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada no Ensino Fundamental I em uma escola da rede pública e uma escola da rede privada, em Cruz das Almas, através de questionários aplicados aos pais e exame clínico que foi realizado nos escolares. Os investigados foram 211 crianças do Ensino Fundamental I, de 06-10 anos e seus respectivos pais, sendo excluídos 139 devido os pais não terem assinado o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), respondido o questionário. Os dados foram organizados no Microsoft Office Excel e a análise estatística será realizada no programa SPSS. O estudo foi submetido à Plataforma Brasil e obteve aprovação do comitê de Ética e Pesquisa, com o parecer de número 2.919.585, respeitando as normas éticas em pesquisa com os seres humanos, como consta na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Os dados ainda estão sendo analisados, pois se trata de um trabalho de TCC em fase de finalização, porém espera-se que o estudo possibilite um repensar dos pais quanto a perda precoce dos primeiros molares inferiores permanentes, pois é considerada um problema de saúde pública, já que tem sido relatado elevados índices de prevalência e a ausência desses dentes, o que ocasionam sequelas na oclusão de pacientes, as quais se não tiverem tratamento adequado, por falta de conhecimento e/ou condições financeiras, podem ocasionar prejuízos estéticos e funcionais.

Palavras Chave: Molar. Erupção dentária. Cárie dentária.

*Graduanda do Curso de Odontologia da Faculdade Maria Milza. E-mail: micheellilemos@gmail.com; ellensilva20@hotmail.com; eliomarsaj@hotmail.com; renataneri01@gmail.com

** Doutora Em Geologia Ambiental/UFBA. Coordenadora do Programa de Iniciação Científica da FAMAM.

***Mestre em Clínica odontológica (Estomatologia) (EBMSP), Coordenadora da Liga de Endodontia da FAMAM professora da FAMAM: carminha_nagahama@yahoo.com.br



**MUDANÇAS, PERSPECTIVAS E TENDÊNCIAS SOCIOESPACIAIS:
15 ANOS DA FAMAM NO RECÔNCAVO DA BAHIA/BRASIL
8 A 10 DE NOVEMBRO DE 2018
FACULDADE MARIA MILZA**

