

PREVALÊNCIA DA LEISHMANIOSE E IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES INFECTADOS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU- BA

Tiago Moura Rodrigues Pereira*
Tatiana Moura Rodrigues Pereira*
Tiana Moura Rodrigues Pereira*
Lara Cristine da Silva Vieira**

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde a leishmaniose é a segunda protozoose mais importante, em termos de mortalidade e prevalência no mundo. Entretanto, o repertório de fármacos disponíveis é limitado e apresenta, na maioria dos casos, baixos índices de eficácia e segurança. A *Leishmania visceral* no corpo humano é fagocitada e transformada na forma amastigota, que se multiplica até ser liberada na corrente sanguínea, destruindo o macrófago e avançando na infecção. Para sua proliferação, acredita-se que surgiu na Amazônia e foi disseminada, sendo esta frequentemente letal, ocasionada por muitos sinais clínicos mediante o diagnóstico confirmado. O diagnóstico confirmatório só poderá ser feito quando o tecido infectado for clinicamente e laboratorialmente investigado, sendo o diagnóstico definitivo difícil. Porém o método parasitológico diagnóstico mais seguro, é feito através da detecção do parasita. A leishmaniose é uma doença de notificação compulsória e requer investigação epidemiológica, portanto todo caso deve ser notificado e investigado. Assim a situação epidemiológica indicará as ações de prevenção e controle a serem adotadas. Com isso, o presente estudo tem como objetivo avaliar a prevalência de pacientes infectados com o parasita da *Leishmania visceral*, identificando o tratamento realizado nos pacientes infectados no município de Cabaceiras do Paraguaçu- BA. Será uma pesquisa de natureza quantitativa, qualitativa e documental. A pesquisa será feita na Secretaria de Saúde, no setor da Vigilância epidemiológica (VIEP) de Cabaceiras do Paraguaçu-Ba no ano de 2014. Para coleta dos dados será realizado uma busca nas notificações dos casos *Leishmania visceral* na VIEP, no período do primeiro semestre de 2013 ao último semestre de 2014, do município. O método escolhido para a análise dos dados será o da estatística descritiva, com a descrição de frequência absoluta e porcentagem. Dessa forma o estudo justifica-se por conhecer a prevalência deste parasita de importância médica, visto que o número de casos se expande entre a população, identificando a terapia medicamentosa a ser utilizada para essa doença, pois na literatura ainda existem diversas lacunas a esse respeito, fortalecendo assim a necessidade das notificações dos casos e proporcionando melhor esclarecimento sobre o tema para a população em geral, principalmente aos portadores da *Leishmania visceral*, favorecendo maior controle e prevenção de novos casos.

Palavra chave: Parasitose. Mortalidade. Tratamento

*Graduando em Bacharelado em Farmácia pela faculdade Maria Milza. Tiagopereira988@gmail.com

*Graduada em Bacharelado em Enfermagem pela faculdade Maria Milza. Tati.rodrigues@hotmail.com

* Graduanda em Bacharelado em Odontologia pela faculdade Maria Milza. tianamrp@gmail.com

** Especialista em Hematologia e Hemoterapia Laboratorial. Professora da Faculdade Maria Milza. larinha_cristine@hotmail.com