

PREVALÊNCIA DE LESÕES CÉRVICO-VAGINAIS EM MULHER DE COMUNIDADE QUILOMBOLA NA BAHIA

Larissa de Andrade*
Marcos Paulo Passos Santos**

O Papiloma Vírus Humano (HPV), conhecido popularmente como cancro duro, verruga genital ou crista de galo, é um vírus que se instala na pele ou nas mucosas causando alterações celulares. Existe mais de 300 tipos de HPVs descritos na literatura, sendo que 60 destes podem infectar a região ano-genital de homens e mulheres. A infecção pelo HPV no trato genital é uma doença sexualmente transmissível (DST), que apresenta elevado índice de mortalidade no Brasil, sendo considerado um problema de saúde pública. Nas ocorrências de câncer do colo uterino, o HPV é responsável por 90% do surgimento da patologia. A infecção é comum e significativa no grupo de mulheres com vida sexual ativa. A principal estratégia para prevenção no Brasil é a detecção do câncer in situ, ou de lesões precursoras através do exame de citologia oncológica (Papanicolau). A detecção precoce da infecção pelo HPV pode trazer uma possibilidade de prevenção do câncer de colo do útero. Este trabalho tem por objetivo diagnosticar as lesões cérvico-vaginais em mulheres da comunidade Remanescente do Quilombo de Tabuleiro da Vitória, Cachoeira- Bahia, e analisar possível associação com ocorrência de câncer do colo do útero. Esse trabalho apresenta abordagem quantitativa do tipo descritiva, a população alvo do estudo é constituída por mulheres quilombolas residente na comunidade Tabuleiro da Vitória, Cachoeira- BA. Na comunidade existe cerca de 1000 mulheres, onde está sendo realizada somente nas mulheres que apresentam vida sexual ativa. A coleta de dados está sendo feito por meio de um formulário aplicado às participantes, de forma a identificar os objetivos do estudo. As populações quilombolas tem características de povos desassistidos que apresentam importantes fatores de vulnerabilidade social, e por se tratar de uma doença muito associada as condições socioeconômica, cultural e geográfica, espera-se encontrar um alto índice de lesões cérvico-vaginais oriunda do HPV nesta população.

Palavras chave: Câncer colo uterino. Papanicolau. Lesão cérvico-vaginal. Quilombolas.

*Discente do Curso de Biomedicina da Faculdade Maria Milza (FAMAM). E-mail: lari.drade@gmail.com

**Biomédico Citopatologista, Docente da Faculdade Maria Milza (FAMAM). E-mail: marcospaulo_passos@hotmail.com