

PROGNÓSTICO DE AVULSÕES DENTÁRIAS FRENTE À REIMPLANTES IMEDIATOS E TARDIOS: RELATO DE CASO

Raphaela Brena Lima dos Santos Barros¹; Iranildo Matheus Leal Nascimento¹; Jéssica Santos da Silva¹; Sergio Uilliam Silva Vilas Boas¹; Maria do Carmo Nagahama²

¹Graduando(a) em Odontologia (FAMAM), raphabrena@hotmail.com; iranildo_matheus@hotmail.com; ssjessica01@gmail.com; illiamvilas04@hotmail.com;

²Mestre em Clínica Odontológica (EBMSP), carminha_nagaham@gmail.com .

A avulsão dentária é caracterizada pela completa retirada do dente do alvéolo de origem. Estudos epidemiológicos evidenciam uma maior incidência de traumas dentais em crianças e adolescentes entre sete e doze anos de idade devido às atividades recreativas, violência interpessoal e acidentes rodoviários, sendo que as avulsões representam até 16% das ocorrências na dentição permanente, afetando principalmente os dentes anteriores. Neste sentido, este trabalho tem por objetivo relatar dois casos de avulsão dentária, onde se adotou como tratamento o reimplante, sendo um imediato e o outro tardio – realizado cinco dias após o trauma. Para a elaboração do presente trabalho foi realizado uma pesquisa bibliográfica, nas bases de dados: SciElo, BVS e Lilacs. Buscou-se artigos publicados no período de 2010 a 2018 relacionados à avulsão dentária e inclusão de dois casos clínicos. Diante das avulsões, o reimplante dentário, que consiste na re inserção do dente em seu alvéolo, é a opção de tratamento mais conservadora. Entretanto, o sucesso deste tratamento depende de alguns fatores, tais como: a idade do paciente e a assistência prestada após o acidente. O prognóstico do reimplante imediato, segundo a literatura, é o mais favorável. Porém, embora possa ter um prognóstico desfavorável, o reimplante tardio também é indicado, visto que este promove o reestabelecimento da função e estética, causando impacto psicológico positivo, importante para a recuperação do paciente. O intervalo de tempo entre o traumatismo e o reimplante, além das condições as quais o dente foi armazenado, representam variáveis fundamentais que interferiram no sucesso do tratamento. Deste modo, evidencia-se a importância da propagação de informações que orientem práticas adequadas de cuidado e manejo da unidade dentária avulsionada.

Palavras-chave: Reimplante dentário. Avulsão dentária. Odontologia.