

## FATORES ASSOCIADOS A REINFECÇÃO DE CANDIDÍASE VAGINAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Aila Santos de Jesus<sup>1</sup>; Larissa Rolim Borges-Paluch<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Graduanda em Biomedicina (UNIMAM), UNIMAM aylamello3@gmail.com; <sup>2</sup>Doutora e Mestre em Ciências Biológicas (UFPR), Docente da Graduação e do Mestrado da UNIMAM, larissapaluch@gmail.com

A levedura *Candida albicans* é o principal agente etiológico da candidíase vulvovaginal (CVV) representando entre 80% a 92% dos casos diagnosticados, e podendo afetar entre 50% a 75% das mulheres durante seu ciclo da vida. Cerca de 5% das mulheres que apresentam CVV podem apresentar essa infecção de repetição, ocorrendo entre quatro ou mais episódios em um ano. O agente etiológico é o gênero *Candida*, e a espécie *C. albicans* é o principal responsável por 85% a 90% dos casos recorrentes, seguida pelas espécies *Candida glabrata* e *Candida tropicalis*. Os principais sintomas da CVV são prurido e queimação intensos, coceira, dispareunia (dor genital durante a relação sexual), disúria (dor e desconforto ao urinar), edema e eritema vulvovaginal. Também pode ocorrer o corrimento vaginal de odor forte, aspecto cremoso e grumoso, de coloração clara, amarela esbranquiçada. O período de maior ocorrência da candidíase geralmente é durante o período pré-menstrual, devido a variações hormonais, como o aumento da progesterona, elevando a acidez vaginal e favorecendo a proliferação do microrganismo. Além desse, outros fatores podem facilitar a infecção dessa levedura, como estresse, uso prolongado de antibióticos, roupas justas, contraceptivos, doenças pré-existentes (como a diabetes mellitus), deficiências imunológicas entre outros. Visando aprofundar o conhecimento sobre a doença que acomete milhões de mulheres anualmente em todo o mundo o objetivo geral do estudo é analisar a literatura científica em relação aos fatores de risco para a reinfecção de candidíase vulvovaginal. Os objetivos específicos são: Categorizar os principais fatores predisponentes (associados) à recidiva por *Candida*; descrever os possíveis tratamentos e as melhores terapias medicamentosas. O presente estudo trata-se uma revisão de literatura integrativa. Para tanto, será realizado um levantamento bibliográfico de artigos científicos nas bases de dados do Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PubMed. No momento da pesquisa o descritor principal “Candídiase Vulvovaginal” será cruzado com os descritores secundários: “Fatores Predisponentes”, “Fatores de Risco” e os termos correspondentes em espanhol e inglês. Os critérios de inclusão dos estudos serão: artigos nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, abordagem clara do tema proposto, publicação entre janeiro/2016 a agosto/2022, texto completo gratuito disponibilizado online para download. E como critérios de exclusão: artigos sem componentes principais; artigos repetidos nas bases de dados e trabalhos de conclusão de curso (monografias, teses ou dissertações). estudo tem o intuito de contribuir, por meio de um levantamento bibliográfico, com o conhecimento acerca dos principais fatores de risco potenciais para a ocorrência e recidiva da CVV, possíveis tratamentos e terapias. Sendo essa infecção ginecológica um dos motivos que interferem nas relações sexuais e afetivas, e se constitui em um problema para mulheres em todo o mundo.

**Palavras-chave:** Candídiase Vulvovaginal. Fatores Predisponentes. Fatores de Risco.