

## PERFIL DENTÁRIO DE CRIANÇAS DE 6 A 9 ANOS, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA-BA

Grazielle Brito Adriano<sup>1</sup>; Andrea Jaqueira da Silva Borges <sup>2</sup>; Fellipe Moraes Pereira Figueiredo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Estudante do Curso de Bacharelado em Odontologia (UNIMAM), odontograzibadriano@hotmail.com; <sup>2</sup>Pós-Doc em Investigação Científica na Docência (IUNIR), Doutora em Geologia Ambiental (UFBA), Mestra em Solo e água (UFBA), Esp. em Metodologia da Pesquisa (FAMAM), andreajsb@gmail.com; <sup>3</sup> Doutora em Saúde Coletiva (UEFS), Mestra em Saúde Coletiva (UEFS), Esp. em Odontopediatria (Facsete), Esp. Em Ortodontia (Prime), Docente do curso de Odontologia (UNIMAM), fellipempf@gmail.com.

Durante a infância os órgãos dentários sofrem influência direta de fatores genéticos e ambientais. Além dos defeitos formativos, o paciente pediátrico está sujeito a apresentar condições dentárias de interesse odontológico, epidemiológico e de gestão pública. Os acometimentos dentários mais frequentes na infância são as lesões cáries e periodontais, hipomineralização molar-incisivo, hipoplasia, fluorose e maloclusão. Como objetivo geral o estudo buscou, por meio de um levantamento epidemiológico, traçar o padrão de saúde bucal de escolares de seis a nove anos, em relação à presença de hipomineralização molar-incisivo, cárie dental, fluorose e má oclusão, no município de Santa Teresinha, Bahia. Como objetivos específicos: descrever a prevalência de cada uma das condições bucais, analisar a relação entre cárie dentária e as demais condições bucais, determinar quais as unidades dentárias mais acometidas com cárie, fluorose e HMI e verificar a prevalência de cada um dos problemas bucais por idade e sexo. Trata-se de uma pesquisa transversal, de caráter descritivo e natureza quantitativa, conduzida nas escolas municipais Salvador Andrade, Mônica e Marlene, Chapeuzinho Vermelho e Kleber Pacheco localizadas em Santa Teresinha, Bahia. Os participantes da pesquisa foram 127 crianças matriculadas nas escolas citadas, segundo os critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. A coleta dos dados foi realizada, após o consentimento do responsável pelo menor. Os índices utilizados foram selecionados de acordo com preconizado pela literatura para cada condição, para Hipomineralização Molar-Incisivo e Hipomineralização de Segundos Molares Decíduos utilizou-se o índice proposto por Ghanim, da Academia Europeia de Odontopediatria, para identificação da presença de cárie dentária o índice CPO-D e ceo-d, os defeitos fluoróticos foram analisados pelo índice de Dean, e a avaliação das maloclusões ocorreram por meio um questionário direcionado para análise da oclusão. Os dados coletados foram transcritos para o programa Excel for Windows®, e serão analisados por meio da estatística descritiva e apresentados em tabelas.

**Palavras-chave:** Cárie Dental. Hipomineralização Molar-Incisivo. Fluorose. Má Oclusão. Saúde Bucal.