

PREVALÊNCIA DA PERDA PRECOCE DE MOLARES DECÍDUOS EM CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA-BA.

Cristiane Soares De Castro; Lília Paula de Souza Santos; Andrea Jaqueira da Silva Borges; Fellipe Moraes Pereira Figueiredo.

Graduanda em Odontologia (FAMAM), FAMAM crisco2896@gmail.com; Doutoranda em saúde coletiva (UFBA) lilia_paula@yahoo.com.br; Doutora em Geologia Ambiental (UFBA), FAMAM, andreajsb@gmail.com; Especialista em odontopediatria e ortodontia FAMAM, Fellipempf@gmail.com.

Os dentes decíduos exercem um papel importante na estética, fonética e função estomatognática, além de desempenharem o papel de manutenção do perímetro do arco e serem guias para erupção dos sucessores permanentes. No entanto, determinadas circunstâncias como a presença de lesões de cárie extensas e episódios de trauma, podem resultar na perda precoce dessas unidades. A cárie dentária é o fator mais comum que ocasiona a perda precoce dos molares decíduos. Visto que é uma doença de etiologia conhecida, sendo possível a prevenção e o controle, mas tratar apenas as lesões existentes não é suficiente para evitar a sua reincidência. O cirurgião dentista deve fazer uma anamnese detalhada, que o permita conhecer os hábitos das crianças e assim, elaborar um correto plano de tratamento. Quando a perda precoce ocorre, há uma tendência de migração dos dentes adjacentes para os espaços vazios, desequilíbrio da oclusão, favorecimento do surgimento de apinhamento dentário, impactação dos dentes permanentes sucessores, redução da capacidade mastigatória, distúrbios na fonética, gatilho para hábitos deletérios e problemas psicológicos. Apesar da perda dos dentes anteriores exercerem um impacto importante na harmonia facial, a literatura aponta que ela pouco influencia na diminuição do perímetro do arco, diferente do que ocorre no segmento posterior, sobretudo com os molares decíduos. Desta forma, o presente estudo buscará por meio de um levantamento epidemiológico analisar, a prevalência da perda precoce de molares decíduos em crianças na cidade de Santa Teresinha, Bahia. Será realizada uma pesquisa transversal, descritiva e de caráter quantitativo, com escolares entre 03 e 09 anos de idade, domiciliadas no município de Santa Teresinha. Os resultados deste estudo poderão ser utilizados no planejamento de saúde pública.

Palavras chave: Epidemiologia, dentição decídua, cáries, desequilíbrio da oclusão